

«Непридатні пестициди. Правила поведінки при НС»



Пестициди (від лат. *pestis* —зараза, *caedo* — вбиваю) — речовини, які використовуються в сільському господарстві, для контролю за розмноженням та попередження появи сільськогосподарських шкідників (шкідливими або небажаними мікроорганізмами, рослинами і тваринами). Непридатні пестициди — високотоксичні хімічні речовини, що негативно впливають на здоров'я людини та довкілля.

Як розпізнати?

- Напівзруйновані будівлі без даху, вікон та дверей.
- Різкий, неприємний запах хімікатів у воді або повітрі.
- Багаторічна відсутність дерев, кущів і трави в місцях, де були розсипані (розлиті) або закопані речовини.

Заходи безпеки!

- Не підходьте без захисного одягу, взуття, респіраторів та окулярів.
- Не використовуйте для оброблення рослин на власному городі.
- Не використовуйте будівельні матеріали та тару зі складів з пестицидами.
- Не дозволяйте гратися дітям поблизу складів з будь-якими хімічними речовинами.
- Не вирощуйте нічого поблизу складів з будь-якими хімічними речовинами чи місцях їх розливу (розсипання).
- Не використовуйте воду для пиття чи поливу з джерел, що розташовані поблизу від складських приміщень пестицидів.
- Не купайтеся та не ловіть рибу у водоймах, які знаходяться поблизу складів з непридатними пестицидами.

Симптоми отруєння (проявляються через 15-60 хвилин)!

- Загальна слабкість, запаморочення.
- Підвищення слино- та потовиділення, температури тіла.
- Поява вологого кашлю, бронхоспазмів, утрудненого дихання.
- Нудота, болі у животі, блювота.
- Підвищення артеріального тиску, виникнення аритмії різного виду.
- У важких випадках - м'язове сіпання в основному м'язів обличчя), судоми та кома.

Перша допомога.

- Покиньте місце де знаходяться пестициди.
- Зніміть одяг. Який міг просякнутися токсичною речовиною.
- Прийміть душ з милом.
- У разі потрапляння пестицидів на шкіру, проведіть дезінфекцію, протерши уражені ділянки будь-яким кислотно-лужним розчином.
- Якщо отрутохімікати потрапили до ротової порожнини та глотки, викличте блювоту, промийте шлунок та прийміть активоване вугілля (сорбент). Через 10-15 хвилин прийміть проносне (30г марганцівки на склянку води).
- Якомога швидше зверніться до лікаря!